

CLITOPILUS (Fries ex Rabenhorst) Kummer 1871 (m) Entolomataceae (7 Gattungen)
Führer f. Pilzkunde S.96,1871 Agaricales (26 Familien)
Basidiomycetes

RÄSLING

= Hexajuga Fayod 1889, = Rhodosporus Schroeter 1889, = Orcella Kuntze ex Earle 1909,
= Pleuropus Murrill 1919, = Paxillopsis Lange 1940

Typus

Agaricus prunulus Scop. : Fr.

Artenzahl

Krieglsteiner 6, Ludwig 10, Moser 9, Noordeloos 6 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 25)

Kennzeichnung

Boden- und Holzsaprobiont in Wäldern und Grasland

Fruchtkörper kleiner bis mittelgroßer Blätterpilz von omphaloidem bis pleurotoidem Habitus

Hut kahl, trocken, nicht hygrophan, in weißen oder braunen Farben, Rand zumindest jung eingerollt

Lamellen herablaufend, weiß, später rosa bis rosabraun

Stiel zentral, seitlich oder ganz fehlend, ohne Velum

Fleisch oft mit mehlartigem Geruch, Geschmack mild bis bitter

Hyphensepten ohne Schnallen

keine Zystiden

Sporenpulver rosa

Sporen in Seitenansicht ellipsoid-spindelförmig, mit 3-12 Längsrippen, daher in Frontansicht leicht eckig wirkend, glatt, hyalin bis blaßstrohfarben, ohne Keimporus, inamyloid, Endospor dextrinoid, Episor cyanophil

Bemerkungen

Clitocybe hat glatte Sporen ohne Längsrippen

Rhodocybe besitzt warzig-rauhe Sporen und Zystiden

Entoloma ist durch eckige Sporen in allen Ansichten gekennzeichnet

Literaturhinweise

Josserand Bull.Soc.Linn.Lyon 10:2,1941

Clémenton ZfP 39:245,1974

Singer The Agaricales in modern taxonomy S.667,1975

Singer Sydowia 31:235,1979 (Schlüssel)

Moser Die Röhrlinge und Blätterpilze in Gams Kl. Kryptogamenflora Bd.IIb/2 S.190,1983

Runge ZfM 50(1):13,1984

Noordeloos Persoonia 12:155-167,1984

Stangl Beitr.Kennt.Pilze Mitteleurop. 3:337-338,1987

Noordeloos Flora Agaricina Neerlandica 1:82,1988

Noordeloos Nordic Macromycetes 2:341,1992

Ludwig Pilzkompendium 1:61,2001

Krieglsteiner Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.4:138,2003

Moser-Jülich Farbatlas der Basidiomycetes, Gattungsdiagnosen Teil 3: Agaricales

Stand: Januar 2006