

DENTIPELLIS Donk 1962 (f)
Persoonia 2:232,1962

Hericiaceae (5 Gattungen)
Russulales (11 Familien)
Basidiomycetes

ZAHNHAUT

Typus

Hydnum fragile Pers. : Fr.

Artenzahl

Jülich 1, Krieglsteiner 1, Strid 1 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 4)

Kennzeichnung

Laubholz-Saprobiont

Fruchtkörper resupinat-membranöser Überzug, häutig dünn, mit hydroidem Hymenophor, weißlich
Stacheln, lang, fein, gekrümmt, geotropisch orientiert, trocken zerbrechlich

Hyphenstruktur monomitisch, Hyphen hyalin, Septen mit Schnallen

Gloeozystiden vorhanden

Basidien schmalkeulig, hyalin

Sporen kugelig, glatt bis feinwarzig, hyalin, dünnwandig, amyloid

Bemerkungen

Hericium und Creolophus bilden keine schichtigen, sondern dickwulstige Fruchtkörper aus
Mucronella hat freistehende Stachelgruppen und keine Gloeozystiden

Literaturhinweise

Jahn Westfäl. Pilzbr. 7:132,1969

Neubert Westfäl. Pilzbr. 7:105,1969

Jülich Die Nichtblätterpilze in Gams Kl. Kryptogamenflora Bd.IIb/1, S.114,1984

GINNS Windahlia 16:35,1986 (Schlüssel)

Krieglsteiner ZfM Beiheft 6:192, 1985; Beitr.Kenntn.Pilze Mitteleur. 4:109,1989

Strid Nordic Macromycetes 3:283,1997

Krieglsteiner Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.2:96,2000

Moser-Jülich Farbatlas der Basidiomycetes, Gattungsdiagnosen Teil 5: Aphyllophorales