

**STEPHANOSPORA** Patouillard 1914 (f)  
Bull.Soc.Myc.Fr. 30:349,1914

Stephanosporaceae (1 Gattung)  
Russulales (11 Familien)  
Basidiomycetes

## **MÖHRENTRÜFFEL**

### Typus

Hydnangium caroticolor Berk.

### Artenzahl

Jülich 1, Krieglsteiner 1, Montecchi 1 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 4)

### Kennzeichnung

Subhypogäe in feuchten, nackten Kalklehmböden von Laubwäldern (Auwaldtyp)  
Fruchtkörper kugeliger Bauchpilz, stumpf karottenrot gefärbt, Basis ohne Myzelstrang  
Peridie sehr dünn, nicht abziehbar, im Alter sich fetzig ablösend  
Gleba im Kammern gegliedert, gelborange bis karottenrötlich, fleischig fest bis brüchig, nicht milchend  
keine Columella  
Sporen ellipsoid, jung kleinhöckerig bis feinstachelig, reif grobstachelig

### Bemerkungen

Octavianina hat an der Luft schwärzende Fruchtkörper, die aus der Gleba einen wässrigen Saft ausscheiden

### Literaturhinweise

Soehner ZfP 21(3):11,1949  
Oberwinkler et Horak Pl.Syst.Evol. 131:157,1979  
Groß-Runge-Winterhoff ZfM Beiheft 2,1980  
Jülich Die Nichtblätterpilze in Gams Kl.Kryptogamenflora Bd.IIb/1, S.533,1984  
Krieglsteiner et Enderle Beitr.Kenntn.Pilze Mitteleur. 2:157,1986  
Montecchi et Sarasini Funghi ipogei d'Europa :622,2000  
Krieglsteiner Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.2:189,2000  
Moser-Jülich Farbatlas der Basidiomycetes, Gattungsdiagnosen Teil 7: Gastromycetes