

**SUBULICYSTIDIUM** Parmasto 1968 (n)  
Consp.Syst. Cort. S.120, 1968

Hyphodermataceae (22 Gatt.)  
Polyporales (23 Familien)  
Basidiomycetes

## PFRIEMZYSTIDENPILZ

### Typus

*Hypochnus longisporus* Pat.

### Artenzahl

Jülich 1, Kriegsteiner 1, Vesterholt 1 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 7)

### Kennzeichnung

Laubholz-Saprobiont

Fruchtkörper resupinat-effuser Überzug, membranös, glatt, weißlich, ohne Rhizomorphen

Hyphenstruktur monomitisch, Hyphen hyalin, Septen mit Schnallen

Zystiden vorhanden, dickwandig, subulat (zugespitzt), basal oft zweiteilig, musterartig ornamentiert

Basidien klein, schmalkeulig, hyalin

Sporen langzylindrisch, glatt, hyalin, dünnwandig, inamyloid

### Bemerkungen

Hyphodontia besitzt andere Sporen und Zystiden

Resinicium hat kopfige Halozytiden

### Literaturhinweise

Jülich Persoonia 8:187,1975

Eriksson-Hjortstam-Ryvarden The Corticiaceae of North Europe 7:1443,1984

Jülich Die Nichtblätterpilze in Gams Kl.Kryptogamenflora Bd.IIb/1, S.219,1984

Vesterholt Nordic Macromycetes 3:135,1997

Kriegsteiner Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.1:341,2000