

**ANTRODIELLA** Ryvar den et Johansen 1980 (f)  
Preliminary Polypore Flora East Africa S.256,1980

Steccherinaceae (14 Gattungen)  
Polyporales (23 Familien)  
Basidiomycetes

## **WEISSFÄULETRAMETE**

### Typus

*Polyporus semisupinus* Berk. et Curtis

### Artenzahl

*Bernichia* 8, Jülich 4, Krieglsteiner 3-5, Ryvar den 12, Vesterholt 7 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 32)

### Kennzeichnung

Holzsaprobiont, Weißfäule-Erreger

Fruchtkörper meist einjähriger Porling, krustenförmig bis hutbildend, hellfarben weißlich-ockerlich, frisch weich bis lederig, trocken hart

Röhren mitunter harzig getränkt

Poren klein, blaßocker bis strohfarben

Context weißlich-ockerfarben

Hyphenstruktur dimitisch, generative Hyphen hyalin, Septen mit oder ohne Schnallen,

Skeletthyphen meist unverzweigt, hyalin, dickwandig

keine echten Zystiden, z.T. mit spitzen Enden von Skeletthyphen

Basidien klein, hyalin, meist viersporig

Sporen klein (unter 5 µm), ellipsoid-kugelig, seltener zylindrisch, glatt, hyalin, dünnwandig, inamyloid

### Bemerkungen

*Junghuhnia* ist verwandt, besitzt aber inkrustierte Skelettzystiden

*Flaviporus* mit kräftig gelben Poren hat große Zystiden

bei *Cinereomyces* lassen sich die hyalinen Skeletthyphen leicht in KOH auflösen

### Literaturhinweise

Niemelä *Karstenia* 22:11,1982

Jülich Die Nichtblätterpilze in Gams Kleine Kryptogamenflora Bd.IIb/1, S.359,1984

Gilbertson et Ryvar den *European Polypores* 1:147,1993

Moser-Jülich Farbatlas der Basidiomyceten, Gattungsdiagnosen Teil 5: Aphyllophorales

Vesterholt *Nordic Macromycetes* 3:207,1997

Krieglsteiner Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.1:482,2000

*Bernichia* *Polyporaceae* s.l. in *Fungi Europaei* Bd.10,2005