

ASCOCORYNE Groves et Wilson 1967 (f)
Taxon 16:35,1967

Helotiaceae (101 Gattungen)
Helotiales (15 Familien)
Ascomycetes

GALLERTBECHER

Typus

Lichen sarcoides Jacq. (:Fr.)

Artenzahl

Dennis 3, Dissing 4 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 6)

Kennzeichnung

Holzsaprobiont, auch im Sphagnum

Fruchtkörper kreiselförmiges Apothezium, anfangs kugelig geschlossen, fleisch- bis violettrot, von gelatinöser Substanz, beim Trocknen hornartig fest, Außenschicht (Exzipulum) mit kugeligen Zellen

Asci achtsporig, Spitze mit Jodlösung blau/violett verfärbend

Sporen ellipsoid, glatt, hyalin, nicht oder mehrfach septiert

Bemerkungen

Anamorph (Nebenfruchtform) ist Coryne Nees : Fr.

Literaturhinweise

Christiansen Friesia 7:75,1963

Groves et Wilson Taxon 16:35-41,1967

Dennis British Ascomycetes S.109,1968

Roll-Hansen Norw.Journ.Bot. 26:193,1979

Baral ZfM Beiheft 6:95,1985

Verkley Mycological Research:99:187,1995

Dissing Nordic Macromycetes 1:136,2000