

**BOIDINIA** Stalpers et Hjortstam 1982 (f)

Stereaceae (22 Gattungen)  
Russulales (11 Familien)  
Basidiomycetes

## **FLOCKENSCHWAMM**

### Typus

Hypochnus furfuraceus Bres.

### Artenzahl

Jülich 2, Vesterholt 1 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 10)

### Kennzeichnung

Nadelholz-Saprobiont

Fruchtkörper resupinat-effuser Überzug ohne gestaltetes Hymenophor, weich-membranös, nur leicht mit dem Substrat verwachsen

Hyphenstruktur monomitisch, Hyphen hyalin, Septen mit Schnallen

Gloeozystiden vorhanden, mit positiver Aldehyd-Reaktion

Basidien schmalkeulig bis urniform, hyalin, viersporig, mit basaler Schnalle

Sporen kugelig bis nierenförmig, warzig, hyalin, amyloid

### Bemerkungen

Gloeocystidiellum hat ellipsoide, meist glatte Sporen mit anderen Maßen und Hyphensepten meist ohne Schnallen

### Literaturhinweise

Jülich Die Nichtblätterpilze in Gams Kleine Kryptogamenflora Bd. IIB/1, S.120,1984

GINNS et FREEMAN Bibl.Mycol. 157,1994

Vesterholt Nordic Macromycetes 3:278,1997