

BOLETINUS Kalchbrenner 1867 (m)
Mohls Bot. Zeitschrift 25:182, 1867

Suillaceae (2 Gattungen)
Boletales (18 Familien)
Basidiomycetes

SCHUPPENRÖHRLING

= *Euryporus* Quélet 1886

Typus

B. cavipes (Opat.) Kalchbr.

Artenzahl

Krieglsteiner 1+2, Moser 2 (Weltflora: Ainsworth-Bisby -, Singer 12)

Kennzeichnung

Mykorrhiza-Pilz mit Lärche

Fruchtkörper mittelgroßer Hutpilz mit röhrigem Hymenophor

Hut filzig-schuppig, trocken

Hymenophor jung mit Partialvelum bedeckt, Röhren sehr kurz und schwer vom Hutfleisch abtrennbar, am Stiel herablaufend oder angewachsen

Poren sehr weit, langgestreckt, eckig, radial orientiert, gelb

Stiel meist hohl, ohne Drüsenpunkte, mit filzig-häutigen Velumresten, später flockig beringt
Fleisch kaum blauend

Hyphensepten mit Schnallen

Röhrenrama bilateral

Cheilo- und Pleurozystiden vorhanden, groß, meist gelb inkrustiert

Basidien mit Basisschnalle

Sporenpulver in Masse schmutzig olivgelb bis lehmfarben

Sporen langellipsoid bis spindelig, glatt, blaß honigfarben

Bemerkungen

Smith et Thiers (1971) stellen *Boletinus* zu *Suillus*

Suillus hat einen schmierigen Hut, keinen hohlen Stiel, oft Drüsenkörnchen und keine Septenschnallen, die Übergänge sind aber fließend

Literaturhinweise

Singer Die Röhrlinge in Pilze Mitteleuropas Bd.5.1, 1965

Watling Boletaceae, Gomphidiaceae, Paxillaceae 1970

Pilat et Dermek Hribovité huby (slowakisch) 1974

Singer Sydowia 30:227, 1977 (Schlüssel)

Moser Die Röhrlinge und Blätterpilze in Gams Kl. Kryprogamenflora Bd.IIb/2, S.59, 1983

Alessio Boletus in Fungi Europaei Bd.2 S.424, 1985

Moser-Jülich Farbatlas der Basidiomyceten, Gattungsdiagnosen Teil 2: Boletales

Kallio et Heikkilä Nordic Macromycetes 2:56, 1992

Galli et Simonini I Boleti Milano 1998

Krieglsteiner Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.2:206, 2000

Stand: April 2003