

CLAVULINA Schroeter 1888 (f)
Kryptog.-Flora Schlesiens Pilze 3:442,1888

Clavulinaceae (3 Gattungen)
Cantharellales (7 Familien)
Basidiomycetes

KEULENPILZ

= Stichoramaria Ulbrich 1928

Typus

Clavaria cristata (Fr.) Schroeter

Artenzahl

Jülich 5, Knudsen 4, Krieglsteiner 4 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 32)

Kennzeichnung

Bodensaprobiont, seltener auch an morschem Holz

Fruchtkörper verzweigtes oder unverzweigtes Holothezium ohne Hymenophor, wachsartig-weichfleischig, nicht brüchig

keine Zystiden

Basidien zylindrisch bis schmalkeulig, mit 2 einwärts gekrümmten Sterigmen

Sporenpulver weiß

Sporen fast kugelig, glatt, hyalin, dünnwandig, inamyloid, nicht cyanophil, mit einem großen Öltropfen

Bemerkungen

Die Gattung ist durch die zweisporigen Basidien, das weiße Sporenpulver und die glatten Sporen gut von nahestehenden Gattungen abgegrenzt

Literaturhinweise

Corner A monograph of Clavaria and allied genera S.294-342,1950

Petersen Mycologia 59:39,1967

Corner Nova Hedwigia Beiheft 33:149-169,1970

Jülich Die Nichtblätterpilze in Gams Kl. Kryptogamenflora Bd.IIb/1 S.92,1984

Krieglsteiner ZfM Beiheft 6:183,1985

Moser-Jülich Farbatlas der Basidiomycetesn, Gattungsdiagnosen Teil:5. Aphyllophorales

Knudsen et Vesterholt Nordic Macromycetes 3:254,1997

Krieglsteiner Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.2:53,2000