

**CRINIPPELLIS** Patouillard 1889 (f?)  
Journal Bot. 3:336,1889

Tricholomataceae (107 Gatt.)  
Agaricales (15 Familien)  
Basidiomycetes

## **HAARSCHWINDLING**

### Typus

Agaricus stipitarius Fr.

### Artenzahl

Knudsen 2, Krieglsteiner 1, Ludwig 5, Moser 3 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 75)

### Kennzeichnung

Pflanzenparasit und Saprobiont an Pflanzenresten auf kurzgrasigen Wiesen und in Trockenrasen, vorwiegend jedoch tropisch  
Fruchtkörper kleiner Blätterpilz von marasmioidem Habitus, auch collybioid, Hut und Stiel behaart  
Haare dickwandig, glatt, dextrinoid, pseudoamyloid, in KOH olivlich verfärbend  
Lamellen blaßcremefarben  
Stiel zentral bis exzentrisch, sehr dünn, braun  
Hyphensepten mit Schnallen  
Cheilo- und Pleurozystiden vielgestaltig, dünnwandig, nicht dextrinoid  
Basidien meist viersporig  
Sporenpulver weiß  
Sporen ellipsoid, glatt, hyalin, inamyloid, cyanophil, ohne Keimporus

### Bemerkungen

Marasmiellus kann ebenfalls Huthaare besitzen, die jedoch nicht dextrinoid sind  
Marasmius besitzt eine verschiedene Huthautstruktur (hymeniform oder Bürstenzellen)

### Literaturhinweise

Singer A monographic study of the genera Crinipellis and Chaetocalathus Lilloa 8:441,1942  
Josserand Bull.Soc.Myc.Fr. 81:527-531,1965  
Singer et Clémenton Nova Hedwigia 23:305,1973  
Singer The Agaricales in modern taxonomy S.368,1975  
Moser Die Röhrlinge und Blätterpilze in Gams Kl. Kryptogamenflora Bd.IIb/2, S.162,1983  
Redhead The genus Crinipellis in Canada Borg o Val de Taro S.175-199,1986  
Knudsen Nordic Macromycetes 2:117,1992  
Antonin Clusiana 33(3):9,1994  
Noordeloos Flora Agaricina Neerlandica 3:135,1995  
Moser-Jülich Farbatlas der Basidiomycetes, Gattungsdiagnosen Teil 3: Agaricales  
Krieglsteiner Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.3:229,2001  
Ludwig Pilzkompodium 1:83,2001

Stand: März 2006