

DISCINELLA Boudier 1885 (f)
Bull.Soc.Myc.Fr. 1:112,1885

Helotiaceae (101 Gattungen)
Helotiales (15 Familien)
Ascomycetes

SCHEIBENBECHERCHEN

Typus

D. boudieri (Quélet) Boud.

Artenzahl

Dennis 3, Vesterholt 2 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 5)

Kennzeichnung

Bodensaprobiont

Fruchtkörper sehr kleiner pezizoider Becherling, weichfleischig, jung kelchförmig, zuletzt dem Boden anliegend

Paraphysen fädig, verzweigt

Asci inoperkulat, achtsporig, Porus mit Jodlösung z.T. blauend

Sporen ellipsoid bis langspindelig, unseptiert, hyalin, mit mehreren Öltropfen

Bemerkungen

Calycella mit gelben Apothezien wächst an Holz

Geocoryne besitzt eine gelatinöse Fruchtkörperwandung

Discina/Gyromitra mit viel größeren Fruchtkörpern steht wegen der operkulaten Asci bei den Helvellaceen

Literaturhinweise

Dennis Mycol.Pap. 62,1956

Dennis British Ascomycetes 1968

Benkert Boletus 5(2):33,1981

Baral ZfM Beiheft 6:112,1985

Vesterholt Nordic Macromycetes 1:146,2001