

ECHINODERMA (Locquin ex Bon) Bon 1991 (n)
Doc. My. 21(82):61,991

Agaricaceae (51 Gatt.)
Agaricales (26 Familien)
Basidiomycetes

STACHELSCHIRMLING

Typus

Agaricus acutesquamosus Weinmann

Artenzahl

Gminder 10 (Weltflora: Ainsworth-Bisby -)

Kennzeichnung

Saprobiont auf Wiese, Ruderalplätzen, in Parks und Gärten, unter Gebüsch

Fruchtkörper in rosa-, wein- bis dunkelbraunen Farben

Huthaut körnelig-schuppig, Schuppen braun

Lamellen frei, oft stark gedrängt

Sporenpulver weiß

Sporen ellipsoid, cyanophil, dextrinoid (Ausnahme: *E. boertmannii*), zweikernig

Bemerkungen

wird z. T. bei *Lepiota* belassen, *Lepiota* hat aber eine andere Huthautstruktur und einkernige Sporen

Literaturhinweise

Knudsen Bot. Tidsskr. 75:121,1981

Moser-Jülich Farbatlas der Basidiomyceten, Gattungsdiagnosen Teil 3: Agaricales

Gminder Die Großpilze Baden-Württembergs Band 4:57,2003