

GUEPINIOPSIS Patouillard 1883 (f)
Tab. Anal. Fung.1:27,1883

Dacrymycetaceae (8 Gattungen)
Dacrymycetales (2 Familien)
Basidiomycetes

HAARGALLERTPILZ

= Heterotextus Lloyd 1922

Typus

G. torta Pat. (= G. buccina)

Artenzahl

Jülich 4, Krieglsteiner 3, Torkelsen 1 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 3-4)

Kennzeichnung

Saprobiont an Laub- und Nadelholz

Fruchtkörper sehr kleiner Gallertpilz, erst pustelförmig, dann scheiben- bis becherförmig, festgallertig, außen runzlig, sterile Oberfläche mit dickwandigen Haaren

Hymenium auf den becherförmig vertieftem Teil der Oberseite beschränkt, bernsteingelb

Context homogen

Basidien hyphenartig, dichotom verzweigt (Gabelbasidie), unseptiert, zweisporig

Sporen zylindrisch, ellipsoid, auch etwas verbogen, glatt, hyalin, mit 1-7 Septen

Bemerkungen

Die meisten Arten sind keine Großpilze

Dacryomyces besitzt keine Oberflächenhaare und weniger oft septierte Sporen

Literaturhinweise

Kennedy Mycologia 50:874,1959

Reid Trans.Brit.Myc.Soc. 62(3):433,1974

Jülich Die Nichtblätterpilze in Gams Kl. Kryptogamenflora Bd.IIb/1, S.441,1983

Grauwinkel und Hechler ZfM 52(1):160,1986

Moser-Jülich Farbatlas der Basidiomycetes, Gattungsdiagnosen Teil 6: Heterobasidiomycetes

Torkelsen Nordic Macromycetes 3:96,1997 (unter Heterotextus)

Krieglsteiner Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.1:82,2000