

LAGAROBASIDIUM Jülich 1974 (n)

Schizoporaceae (8 Gattungen)
Hymenochaetales (2 Familien)
Basidiomycetes

RINDENFLOCKEN

Typus

Odontia pruinosa Bres. in BG

Artenzahl

Jülich 2 (Weltflora: Ainsworth-Bisby -)

Kennzeichnung

Saprobiont an Holz und Pflanzenresten

Fruchtkörper resupinat-membranöser Überzug, glatt-warzig-odontioid, lose mit dem Substrat verbunden

Hyphenstruktur monomitisch, Hyphen hyalin, Septen mit Schnallen

Leptozystiden pfriemförmig-schmal oder schmalkeulig, hyalin, nicht septiert

Basidien suburniform bis schmalkeulig, hyalin, mit basaler Schnalle

Sporen breitellipsoid, etwas dickwandig, glatt, hyalin, inamyloid

Bemerkungen

wird neuerdings zu *Hyphodontia* gestellt (Langer 1994)

Christinia besitzt keine derartigen Zystiden

Hypochniciellum hat schmalellipsoide Sporen

Literaturhinweise

Eriksson-Ryvarden The Corticiaceae of North Europe 4:...,1976

Jülich Die Nichtblätterpilze in Gams Kl. Kryptogamenflora Bd.IIb/1, S.178,1984

Langer Bibl. Mycol. 154,1994