

MITRULA Fries in Liljeblad 1816 : Fr. 1821 (f)
Syst. mycol. 1:491,1821

Helotiaceae (101 Gattungen)
Helotiales (15 Familien)
Ascomycetes

HAUBENPILZ

Typus

M. paludosa Fr.:Fr.

Artenzahl

Ohenoja 1 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 7)

Kennzeichnung

Saprobiont an Pflanzenresten an nassen Standorten
Fruchtkörper gestielt-kopfiges Apothezium in gelbbraunen Farben
Hyphensepten ohne Schnallen
Paraphysen schlank, fädig, septiert
Asci zylindrisch, achtsporig, inoperkulat, mit Jodlösung blauend
Sporen zylindrisch-schmalellipsoid, hyalin, nicht oder einfach septiert

Bemerkungen

Microglossum hat grünlich gefärbte Fruchtkörper
Heyderia wächst an anderen Standorten und hat einen durch eine sterile Rinne vom Stiel abgesetzten Kopfteil
Spathularia und Cudonia haben mehrfach septierte Sporen

Literaturhinweise

Kankainen *Karstenia* 9:23-24,1969
Redhead *Can.J.Bot.* 55:307,1977 (Nordamerikanische Arten)
Knudsen *Bot.Tidsskrift* 69:248-252,1978 (Dänische Arten)
Benkert *Gleditschia* 10:141-171,1983
Verkeley *Persoonia* 15:405,1994
Gernandt et al. *Mycologia* 89:735,1997 (DNA)
Ohenoja *Nordic Macromycetes* 1:182,2000