

PSEUDOPLECTANIA Fuckel 1870 (f)
Jahrb.Nass.Verein Naturkunde 23/24:324,1870

Sarcosomataceae (8 Gattungen)
Pezizales (15 Familien)
Ascomycetes

SCHWARZBORSTLING

Typus

Peziza nigrella Pers. : Fr.

Artenzahl

Dissing 3 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 3-4)

Kennzeichnung

Holzsaprobiont, auch in Nadelstreu und Torfmoosen
Fruchtkörper sitzendes bis kurzgestieltes, schwärzlich gefärbtes Apothezium von unterschiedlicher Größe, mit haarig-flockiger Außenseite
Hyphensepten ohne Schnallen
Paraphysen fädig, meist wenig septiert, Spitze gerade bis eingerollt gekrümmmt
Asci suboperculat, mit schräg sitzenden Deckel, achtsporig, mit Jodlösung nicht blauend
Sporenstaub weiß
Sporen kugelig, glatt, hyalin, vielkernig

Bemerkungen

Plectania hat ellipsoide Sporen

Literaturhinweise

Kreisel Westf. Pilzbriefe 3(5):74-78,1962
Donadini Myc. Helv. 2(2):219, 1987
Dissing et al. Nordic Macromycetes 1:126,2000