

**RHODOCYBE** Maire 1924 (f)  
Bull.Soc.Myc.France 40:298,1924

Entolomataceae (7 Gattungen)  
Agaricales (26 Familien)  
Basidiomycetes

## **TELLERLING**

= Clitopilopsis Maire 1936, = Hirneola Vel. 1939, = Rhodophana Kühner ex Métrod 1952

### Typus

Agaricus caelatus Fr.

### Artenzahl

Ludwig 15, Moser 11, Noordeloos 10 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 40)

### Kennzeichnung

Bodensaprobiont

Fruchtkörper kleiner bis mittelgroßer Blätterpilz, häutig bis fleischig, von collybioidem, omphalioidem oder tricholomatoidem Habitus, in graubraunen bis fleischroten Farben

Hut nicht hygrophan, schwach behaart

Lamellen angeheftet bis herablaufend, graubräunlich

Stiel zentral, ohne Velumreste

Huthaut aus liegenden Hyphen, Hyphensepten ohne Schnallen

Lamellentrama regulär

Cheilozystiden vorhanden

Basidien meist viersporig

Sporenpulver rosa bis graubräunlich

Sporen kugelig-ellipsoid, rauh-warzig-stachelig, cyanophil, inamyloid

### Bemerkungen

Lepista und Ripartites sind ähnlich, haben aber Septenschnallen, bei Lepista sind die Sporen einkernig und nur die Sporen-Warzen cyanophil, nicht die ganze Wandung  
Clitopilus besitzt Fruchtkörper mit weißem Hut, die Sporen sind gerippt

### Literaturhinweise

Lange et Sivertsen Bot.Tidsskr. 62:197,1966

Kühner Bull.Soc.Myc.France 87:15,1971

Singer The Agaricales in modern taxonomy S.669,1975

Pegler et Young Kew Bull. 30:19,1975 (9 Brit.Arten)

Baroni Nova Hedwigia Beiheft 67:1-194,1981 (Revision of the genus)

Moser Die Röhrlinge und Blätterpilze in Gams Kl.Kryptogamenflora Bd.IIb/2, S.188,1983

Horak et Griesser Beitr.Kenntn.Pilze Mitteleur. 3:268-274,1987

Esteve-Raventos et Moreno Beitr.Kenntn.Pilze Mitteleur. 3:157-161,1987

Rauschert Boletus 12(2):45-52,1988

Moser-Jülich Farbatlas der Basidiomyceten, Gattungsdiagnosen Teil 3: Agaricales

Noordeloos Flora Agaricina Neerlandica 1:77,1988

Noordeloos Nordic Macromycetes 2:358,1992

Baroni et Halling Mycologia 84:419,1992 (Schlüssel nordamerik.Arten)

Ludwig Pilzkompendium 1:615,2001

Stand: Juni 2005