

RICKENELLA Raithelhuber 1973 (f)
Metrodiana 4:61,1973

Tricholomataceae (107 Gatt.)
Agaricales (26 Familien)
Basidiomycetes

HEFTELNABELING

Typus

R. fibula (Bull. : Fr.) Raithelhuber

Artenzahl

Gminder 2, Kuyper 2, Ludwig 4, Moser 3 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 5)

Kennzeichnung

Bodensaprobiont, oft mit Moosen vergesellschaftet

Fruchtkörper sehr kleiner Blätterpilz von omphalioidem bis mycenoidem Habitus, in freudigen Farben

Hut häutig, genabelt, gelborange bis braunockerlich

Lamellen weit herablaufend, stark entfernt, weißlich

Stiel zentral, relativ lang, dünn

Lamellentrama subregulär bis regulär

Hyphensepten mit Schnallen

Cheilo- und Pleurozystiden vorhanden

Basidien schlankkeulig, viersporig, mit Basalschnalle

Sporen klein, zylindrisch-ellipsoid, glatt, hyalin, ohne Keimporus, mit Tropfen, inamyloid

Bemerkungen

Morphologisch gehört die Gattung in die Nähe von Hemimycena; Moncalvo et al. (2000) meinen, daß es sich um eine russuloide und nicht agaricoide Gattung handelt

Literaturhinweise

Lamoure Sydowia Beiheft 8:251,1979

Clémenton ZfM 48(2):230-231,1982

Moser Die Röhrlinge und Blätterpilze in Gams Kl.Kryptogamenflora Bd.IIb/2, S.97,1983

Kost ZfM 50(2):215-240,1984

Moser-Jülich Farbatlas der Basidiomyceten, Gattungsdiagnosen Teil 3: Agaricales

Kuyper Flora Agaricina Neerlandica 3:157,1995

Moncalvo et al. Syst. Biol. 49:278,2000

Gminder Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.3:508,2001

Ludwig Pilzkompodium 1:634,2001