

**SEBACINA** Tulasne et Tulasne 1871 (f)

Exidiaceae (28 Gattungen)  
Tremellales (10 Familien)  
Basidiomycetes

## **WACHSKRUSTE**

= *Cristella* Patouillard 1887

### Typus

*Corticium incrustans* Pers. (: Fr.)

### Artenzahl

Jülich 10, Krieglsteiner 4, Torkelsen 9 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 25)

### Kennzeichnung

Saprobiont an Holz und Pflanzenresten, z.T. intrahymenial in Fruchtkörpern anderer Basidiomyceten

Fruchtkörper resupinater Überzug, oft sehr dünn, glatt bis wellig

Hyphenstruktur meist monomitisch, seltener auch dimitisch; generative Hyphen und Skeletthyphen hyalin, Septen ohne Schnallen

Basidien mit Längssepten und langen Protosterigmen, hyalin, ohne Basisschnalle

Sporen glatt, hyalin, dünnwandig, inamyloid, bilden Sekundärsporen aus

### Bemerkungen

Exidiopsis besitzt Hyphensepten mit Schnallen

### Literaturhinweise

McGuire *Lloydia* 4:1,1941

Wells *Mycologia* 53:317,1962

Oberwinkler *Ber.Dtsch.Bot.Ges.* 36:48-54,1963

Oberwinkler *Nova Hedwigia* 7:489,1965

Keller *ZfP* 51:74,1973

Jülich *Die Nichtblätterpilze in Gams Kl.Kryptogamenflora Bd.IIb/1*, S.421,1984

Torkelsen *Nordic Macromycetes* 3:105,1997

Krieglsteiner *Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.1*:115,2000