

STROBILOMYCES Berkeley 1851 (m)
Decades of Fungi Hooker's Journ. Bot.3:77,1851

Boletaceae (26 Gattungen)
Boletales (18 Familien)
Basidiomycetes

STRUBBELKOPFRÖHRLING

= *Eriocorys* Quélet 1886

Typus

Boletus strobilaceus Scop. : Fr.

Artenzahl

Knudsen 1, Krieglsteiner 1, Moser 1 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 20)

Kennzeichnung

Laubbaum-Symbiont in Ektomykorrhiza

Fruchtkörper mittelgroßer bis großer Röhrling

Hut mit dachziegelartig angeordneten großen Schuppen und wolliger Auskleidung,
Schuppen weich und filzig

Hymenophor mit langen Röhren, Röhrenschicht um den Stiel herum niedergedrückt,
Poren jung weißlich-grau, später dunkler

Fleisch rötend bis schwärzend

Hyphensepten ohne Schnallen

Sporenpulver schwarz (wenn frisch)

Sporen kurzellipsoid-kugelig, weitschmählig-netzig ornamentiert mit hohen Netzleisten

Bemerkungen

Porphyrellus hat keine Hutschuppen und langellipsoide Sporen

Literaturhinweise

Singer Die Röhrlinge Teil II in Pilze Mitteleuropas Bd.6,1967

Singer The Agaricales in modern taxonomy S.744,1975

Moser Die Röhrlinge und Blätterpilze in Gams Kl.Kryptogamenflora Bd.IIb/2, S.58,1983

Moser-Jülich Farbatlas der Basidiomyceten, Gattungsdiagnosen Teil 2: Boletales

Knudsen Nordic Macromycetes 2:72,1992

Krieglsteiner Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.2:292,2000