

TYLOPILUS Karsten 1881 (m)
Revue Mycol. 3:16,1881

Boletaceae (26 Gattungen)
Boletales (18 Familien)
Basidiomycetes

GALLENRÖHRLING

= Rhodoporus (Quélet) Bataille 1908, = Rhodobolites Beck 1923, = Leucogyroporus Snell 1942

Typus

Boletus felleus Bull. : Fr.

Artenzahl

Knudsen 1, Krieglsteiner 2, Moser 1 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 75)

Kennzeichnung

Wurzelsymbiont in Ektomykorrhiza mit Laub- und Nadelbäumen

Fruchtkörper mittelgroßer bis großer Röhrling

Hut fleischig, Huthaut in verschiedenen Brauntönen

Hymenophor bei Reife am Rand über die Huthaut überquellend, Poren erst weißlich, dann rosa verfärbend

Stiel dicklich, grob genetzt

Fleisch weißlich, nicht verfärbend, bitter schmeckend

Röhrenrama bilateral

Zystiden vorhanden, gut entwickelt

Sporenpulver rosa bis fleischfarben

Sporen glatt, dünnwandig

Bemerkungen

Es soll von *T. felleus* eine mild schmeckende Varietät *alutarius* geben

Literaturhinweise

Smith Mycologia 60:954,1968

Singer The Agaricales in modern taxonomy S.734,1975

Wolfe Bibl. Mycol. 69,1979 (Nordamerik. Arten)

Moser Die Röhrlinge und Blätterpilze in Gams Kl.Kryptogamenflora Bd.IIb/2, S.69,1983

Moser-Jülich Farbatlas der Basidiomyceten, Gattungsdiagnosen Teil 2: Boletales

Knudsen Nordic Macromycetes 2:72,1992

Galli I Boleti S.248,1998

Bessette, Roodly et Roodly North American Boletes S.256,1999 (30 Nordamerikanische Arten)

Krieglsteiner Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.2:313,2000