



## Bjerkandera fumosa

## Graugelber Rauchporling, Bartloser Porenschwamm

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Meruliaceae

Legitimate (Pers.) P. Karst. 1879

Aktueller Name gem. MycoDB: Bjerkandera fumosa (Pers.) P. Karst., Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica 5: 38 (1879) [MB100991]

Basionym: Boletus fumosus Pers., Synopsis methodica fungorum: 530 (1801) [MB240805]

Obligate Synonyme:

Polyporus fumosus (Pers.) Fr., Observationes mycologicae 2: 257 (1818) [MB156216]

Polystictoides fumosus (Pers.) Teixeira, Revista Brasileira de Botânica 9 (1): 43 (1986) [MB131586]

Tyromyces fumosus (Pers.) Pouzar, Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 1 (4): 370 (1966) [MB340620]

Leptoporus fumosus (Pers.) Pat., Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes: 85 (1900) [MB102265]

Gloeoporus fumosus (Pers.) Pilát, Atlas Champ. Eur., Polypor., B: 161 (1937) [MB356540]

Grifola fumosa (Pers.) Zmitr. &amp; Malysheva, Mycena 6: 21 (2006) [MB504914]

Taxonomische Synonyme:

Polyporus aberrans Velen., Mykologia: 73 (1925) [MB255540]

Polyporus decurrens Velen., Ceske Houby 4-5: 657 (1922) [MB262885]

Polyporus emergens Velen., Ceske Houby 4-5: 657 (1922) [MB263958]

Polyporus eminens Velen., Ceske Houby 4-5: 639 (1922) [MB263971]

Gloeoporus fumosus f. eminens (Velen.) Pilát, Atlas Champ. Eur., Ser. B: 164 (1937) [MB265561]

Polyporus robiniae Velen., Ceske Houby 4-5: 658 (1922) [MB276634]

Polyporus tyttlianus Velen., Ceske Houby 4-5: 686 (1922) [MB280926]

Boletus imberbis Bull., Herbar de la France 10: t. 445:1 (1790) [MB217923]

Leptoporus imberbis (Bull.) Quél., Flore mycologique de la France et des pays limitrophes: 388 (1888) [MB454313]

Cladomeris imberbis (Bull.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 169 (1886) [MB468687]

Merisma imberbis (Bull.) Gillet, Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons qui Croissent en France: 689 (1878) [MB469862]

Polyporus imberbis (Bull.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 451 (1838) [MB170663]

Daedalea imberbis (Bull.) Chevall., Flore Générale des Environs de Paris 1: 247 (1826) [MB210445]

Agaricus imberbis (Bull.) E.H.L. Krause, Basidiomycetum Rostochiensium, Suppl. 4: 141 (1932) [MB468036]

Polyporus demissus Berk., London Journal of Botany 4: 52 (1845) [MB231956]

Merulius demissus (Berk.) Pat., Bulletin Trimestriel de la Société Mycologique de France 24 (1): 5 (1908) [MB440121]

Boletus salicinus Bull., Histoire des champignons de la France. I: 340, t. 433:1 (1791) [MB200433]

Daedalea salicina (Bull.) Purton, An appendix to the Midland flora: 247 (1821) [MB469022]

Polyporus inodorus Chevall., Flore Générale des Environs de Paris 1: 254 (1826) [MB472645]

Polyporus suaveolens var. salicinus Fr., Systema Mycologicum 1: 366 (1821) [MB472855]

Boletus salignus J.F. Gmel., Systema Naturae 2 (2): 1436 (1792) [MB490644]

Boletus suaveolens var. salicinus (Bull.)

Dieser Rauchporling unterscheidet sich von Bjerkandera adusta durch ein helleres Hymenium (Poren)

makroskopisch

**Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren**

Schwärzt sofort bei Berührung

**Gattung/en:**

Bjerkandera

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7618.htm>



**Bjerkandera fumosa**

**Graugelber Rauchporling, Bartloser Porenschwamm**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Meruliaceae

