



Boletopsis leucomelaena

Schwarzer Russporling, Russgrauer Porling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Thelephorales, Bankeraceae

Legitimate (Pers.) Fayod 1889

Aktueller Name gem. MycoDB: Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod, Malpighia 3: 72 (1889) [MB414419]

Basionym: Boletus leucomelas Pers., Synopsis methodica fungorum: 515 (1801) [MB145171]

Obligate Synonyme:

Polyporus leucomelas (Pers.) Pers., Mycologia Europaea 2: 40 (1825) [MB177006]

Polyporus subsquamosus var. leucomelas (Pers.) Fr., Systema Mycologicum 1: 346 (1821) [MB472866]

Polyporus ovinus subsp. leucomelas (Pers.) Bourdot & Galzin, Bulletin de la Société Mycologique de France 41: 102 (1925) [MB493727]

Caloporus leucomelas (Pers.) Quél., Flore mycologique de la France et des pays limitrophes: 405 (1888) [MB462532]

Boletus leucomelaena Pers. (1801) [MB449631]

Caloporus subsquamosus var. subsquamosus (Persoon) Quélet, Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 164 (?) [MB802872]

Taxonomische Synonyme:

Polyporus conspicabilis Britzelm., Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Schwaben Neuburg 29: 274 (1887) [MB181439]

Fungus porcinus Paulet, Traité des champignons 2: 361, pl. 144:3-4 (1793) [MB469281]

Polyporus compactus Pers., Mycologia Europaea 2: 39 (1825) [MB473787]

Boletus violaceus C. Martín, Bull. Trav. Soc. bot. Genève: 192 (1894) [MB168181]

Polyporus violaceus (C. Mart.) C. Mart., Bull. Herb. Boissier: 1290 (1904) [MB473834]

Boletus violascens Sacc., Sylloge Fungorum 14: 167 (1899) [MB123743]

Suillus violaceus (C. Mart.) Kuntze: 536 (1898) [MB586340]

Polyporus scoparius Pers., Mycologia Europaea 2: 39 (1825) [MB472832]

Polyporus formatus Britzelm., Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Schwaben Neuburg 29: 273 (1887) [MB162175]

Polyporus subsquamosus var. repandus Fr., Systema Mycologicum 1: 346 (1821) [MB199176]

Polyporus repandus (Fr.) P. Karst., Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica 5: 37 (1879) [MB473785]

botanisch / ökologisch

Standort

Vorwiegend montaner Fichtenwald

Vorkommen / Häufigkeit / Saison

Selten

mikroskopisch

Sporenform

Eckig-warzig

Gattung/en:

Boletopsis

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7069.htm>



Boletopsis leucomelaena

Schwarzer Russporling, Russgrauer Porling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Thelephorales, Bankeraceae



Flammer, T©

2357 16.10.2011



Flammer, T©

2358 16.10.2011



Flammer, T©

2366 31.10.2023