



Bonomyces sinopicus

Brandstellentrichterling, Kohlenrichterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae, Bonomyces

Legitimate

(Fr.) Vizzini 2014

Aktueller Name gem. MycoDB: Bonomyces sinopicus (Fr.) Vizzini, Index Fungorum 159: 1 (2014) [MB550626]

Basionym: Agaricus sinopicus Fr., Observationes mycologicae 2: 197 (1818) [MB457298]

Obligate Synonyme:

Clitocybe sinopica (Fr.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 123 (1871) [MB161275]

Omphalia sinopica (Fr.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 23 (1886) [MB802649]

Bonomyces sinopicus var. sinopicus (2014) [MB637058]

Taxonomische Synonyme:

Clitocybe subsinopica Harmaja, Karstenia 18: 29 (1978) [MB311376]

Clitocybe sinopica var. aureospora Contu, Boletim da Sociedade Broteriana 63: 383 (1990) [MB355398]

Clitocybe pseudosquamulosa Singer ex Bon, Documents Mycologiques 26 (102): 17 (1996) [MB414800]

Clitocybe chrysophylla Hruby, Hedwigia 70: 243 (1930) [MB260597]

Clitocybe sinopica var. microspora Métrod, Bull. Soc. Mycol. France: 73 (1938) [MB278239]

Clitocybe pseudosquamulosa Singer, Sydowia 31 (1-6): 232 (1979) [MB311361]

Agaricus hinopicus Fr., Observationes mycologicae 2: 197 (1818) [MB494679]

Agaricus sinopicus Fr., Observationes mycologicae 2: 197 (1818) [MB508296]

Der Geruch hat mich sofort an Clitopilus prunulus erinnert, der praktisch denselben Geruch aufweist.

makroskopisch

Fruchtkörperfarbe / Farbspektrum

Fuchsbraun

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Weiss

Hyalin

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Stark mehlig bis ranzig

mikroskopisch

Sporenform

Elliptisch

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Glatt

Gattung/en:

Bonomyces

<https://www.mycopedia.ch/pilze/9507.htm>



Bonomyces sinopicus

Brandstellentrichterling, Kohlenrichterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae, Bonomyces

