



Calocybe gangraenosa

Gerberei-Schwärzling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Lyophyllaceae

Legitimate (Fr.) V. Hofst., Moncalvo, 2012
Redhead & Vilgalys

Aktueller Name gem. MycoDB: Calocybe gangraenosa (Fr.) V. Hofst., Moncalvo, Redhead & Vilgalys, Index Fungorum 8: 1 (2012) [MB550059]

Basionym: Agaricus gangraenosus Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 56 (1838) [MB372119]

Obligate Synonyme:

Lyophyllum gangraenosum (Fr.) Gulden, Nordic Journal of Botany 11 (4): 478 (1991) [MB354476]

Clitocybe gangraenosa (Fr.) Gillet, Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons qui Croissent en France 1: 153 (1874) [MB247673]

Taxonomische Synonyme:

Agaricus leucophaeatus P. Karst., Notiser ur Sällskapetets pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar 9: 336 (1868) [MB463436]

Lyophyllum leucophaeatum (P. Karst.) P. Karst., Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 2 (1): 3 (1881) [MB431763]

Collybia leucophaeata (P. Karst.) Sacc., Sylloge Fungorum 5: 205 (1887) [MB160411]

makroskopisch

Hutmerkmale

Mit weissem Rand, fleckend

Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren

Schwärzend

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Säuerlich

mikroskopisch

Mikroskopische Eigenschaften

In den Lamellenhyphen und Zellen braunes Pigment sichtbar

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Feinwarzig

Varia

Bestimmt als

Lyophyllum leucophaeatum

Gattung/en:

Calocybe

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1010.htm>



Calocybe gangraenosa

Gerberei-Schwärzling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Lyophyllaceae




Flammer, T©

5272 27.09.2014




Flammer, T©

5273 27.09.2014



Flammer, T©

5286 27.09.2014



Flammer, T©

5287 27.09.2014