



Clitocella popinalis

Bereifter Tellerling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae

Legitimate (Fr.) Kluting, T.J. Baroni 2014
& Bergemann

Aktueller Name gem. MycoDB: Clitocella popinalis (Fr.) Kluting, T.J. Baroni & Bergemann, Mycologia 106 (6): 1138 (2014) [MB805409]

Basionym: Agaricus popinalis Fr., Systema Mycologicum 1: 194 (1821) [MB140606]

Obligate Synonyme:

Rhodocybe popinalis (Fr.) Singer, Lilloa 22: 609 (1951) [MB305195]

Clitocybe popinalis (Fr.) Bres., Iconographia mycologica 4: 160 (1927) [MB173918]

Clitopilus popinalis (Fr.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 97 (1871) [MB236572]

Rhodopaxillus popinalis (Fr.) Konrad & Maubl., Revision Hymenomyces de France: 327 (1937) [MB254060]

Clitopilopsis popinalis (Fr.) Kühner ex Konrad & Maubl., Encyclopédie Mycologique 14: 379 (1949) [MB295206]

Paxillus popinalis (Fr.) Ricken, Die Blätterpilze 1: 94 (1915) [MB455887]

Paxillopsis popinalis (Fr.) J.E. Lange, Flora Agaricina Danica 5: VI (1940) [MB302323]

Paxillopsis popinalis (Fr.) J.E. Lange, Flora Agaricina Danica 4: 49 (1939) [MB456172]

Taxonomische Synonyme: Hygrophorus meyenellii Boetje-van Ruyven, Levende Natuur: 324 (1935) [MB492193]

Gemäss Angaben in Ludwig Erhard gibt es eine Varietät mundula mit fruchtigem Geruch, was auf diesen Fund passen würde. Mundula wird jedoch als nicht bitter und nicht mehlig beschrieben. Der vorliegende Fund riecht irgendwie fruchtig angenehm, der Geschmack ist aber ziemlich bitter.

Makroskopisch könnte die Art mit Clitocybe ditopa oder einer Art aus der Gattung Lyophyllum verwechselt werden.

Zweifarbiger Trichterling / Clitocybe metachroa

makroskopisch

Substrat

Nadelstreu

Hutfarbe

Schmutzig grau-braun, ausblassend

Hutmerkmale

Rimos: mit zahlreichen "rissigen" Linien, jung mit geripptem Rand

Stielbasis / Basis

Mit weissem Myzelfilz gestieft

Lamellenfarbe

Jung crème, älter grau-ocker

Lamellenmerkmale

Herablaufend

Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren

Lamellen nach einiger Zeit grauend, dann deutlich schwärzend

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Hellrosa

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Mit fruchtiger Komponente

Geschmack

Ziemlich bitter mit mehlig Komponente



Clitocella popinalis

Bereifter Tellerling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae

mikroskopisch

Sporenlänge

Ca. 5 µm im Durchmesser

Sporenform

Subglobos-eckig

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Undeutlich feinwarzig ornamentiert

chemisch

Chemische Reaktionen

KOH rot auf Huthaut

Pilzporträt JPG

Clitocella popinalis 01

https://www.mycopedia.ch/pilze/collagen/Clitocella_popinalis_01.jpg

Gattung/en:

Clitocella

<https://www.mycopedia.ch/pilze/11061.htm>

Siehe auch

Atractosporocybe inornata

<https://www.mycopedia.ch/pilze/10279.htm>

Clitocybe ditopa

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8097.htm>

schwärzende Pilze

<https://www.mycopedia.ch/pilze/10815.htm>

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7948.htm>



Clitocella popinalis


Bereifter Tellerling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae



Flammer, T©

13794 05.09.2022



Flammer, T©

13795 20.08.2022



Flammer, T©

13796 20.08.2022



Flammer, T©

14015 09.09.2022



Clitocella popinalis

Bereifter Tellerling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae



Flammer, T©

13797 20.08.2022



Flammer, T©

13798 20.08.2022

herablaufende Lamellen

älteres Exemplar
KOH Reaktion



Flammer, T©

14566 17.10.2022



Flammer, T©

14567 17.10.2022



Clitocella popinalis

Bereifter Tellerling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae

