



Clitocybe foetens

Stinkender Trichterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate

Melot 1980

Aktueller Name gem. MycoDB: Clitocybe foetens Melot, Bulletin de la Société Mycologique de France 95 (3): 237 (1980) [MB118529]

makroskopisch

Hutfarbe

Grau bis bräunlich

Hutmerkmale

Hygrophan

Lamellenfarbe

Graue Lamellen

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Weiss

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Nach Gas, unangenehm, ranzig - jung auch mehlig-bis etwas wie der Gurkenschnitzling

botanisch / ökologisch

Standort

Fichtenwald, Nadelstreu

mikroskopisch

Sporenmasse

5.4 - 7.7 x 2.9 - 3.8 µm - Q: 1.64 - 2.36 (Ø LxB: 6.3 x 3.2 µm ØQ:2.0 AzM: 27)

Sporenform

Elliptisch bis zylindrisch

Hutdeckschicht

Oberste Schicht aus dünnen, untere Schicht aus dickeren parallelaufenden Hyphen, Schnallen vorhanden

Gattung/en:

Clitocybe <https://www.mycopedia.ch/pilze/1013.htm>

Siehe auch

Singerocybe phaeophthalma <https://www.mycopedia.ch/pilze/7438.htm>

Clitocybe fragrans <https://www.mycopedia.ch/pilze/4632.htm>

Clitocybe subspadicea <https://www.mycopedia.ch/pilze/5697.htm>



Clitocybe foetens

Stinkender Trichterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae



Flammer, T©

3369 04.11.2012




Flammer, T©

13045 23.10.2021


Sporen

HDS



Flammer, T©

13066 25.10.2021



Flammer, T©

13067 25.10.2021



Clitocybe foetens

Stinkender Trichterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

