



Clitocybe fragrans

Weisser Anistrichterling, Langstieliger Dufftrichterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate (With.) P. Kumm. 1871

Aktueller Name gem. MycoDB: Clitocybe fragrans (With.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 121 (1871) [MB232936]

Basionym: Agaricus fragrans With., A botanical arrangement of British plants 3: 307 (1792) [MB447526]

Obligate Synonyme:

Lepista fragrans (With.) Harmaja, Karstenia 15: 14 (1976) [MB316545]

Omphalia fragrans (With.) Gray, A natural arrangement of British plants 1: 613 (1821) [MB486491]

Pseudolyophyllum fragrans (With.) Raitelth., Metrodiana: 73 (1978) [MB283659]

Taxonomische Synonyme:

Clitocybe deceptiva H.E. Bigelow, Beihefte zur Nova Hedwigia 72: 108 (1982) [MB110559]

Clitocybe acicola Singer, Zeitschrift für Mykologie 56 (1): 6 (1990) [MB134163]

Omphalia luffii Masee, Transactions of the British Mycological Society 1 (1): 21 (1898) [MB148274]

Clitocybe luffii (Masee) Singer, Annales Mycologici 41: 30 (1960) [MB295146]

Clitocybe luffii (Masee) Singer, Annales Mycologici 41: 30 (1943) [MB532411]

Agaricus suaveolens Schumach., Enumeratio Plantarum, in Partibus Sællandiae Septentrionalis et Orientalis Crescentium 2: 337 (1803) [MB243517]

Clitocybe suaveolens (Schumach.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 121 (1871) [MB176023]

Omphalia suaveolens (Schumacher) Quélet, Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 24 (1886) [MB802661]

Clitocybe fragrans var. depauperata J.E. Lange, Dansk botanisk Arkiv 6 (5): 56 (1930) [MB265280]

Clitocybe depauperata (J.E. Lange) P.D. Orton, Transactions of the British Mycological Society 43 (2): 174 (1960) [MB328425]

Relativ kleine Trichterlingsart, die gerne zwischen Moosen wächst und angenehm anisartig riecht. Bei den Trichterlingen gibt es eine ganze Reihe, die einen anisartigen Geruch aufweisen.

Man findet diesen Trichterling an verschiedenen Standorten, zwischen Moosen, im Laub- und Nadelwald.

Clitocybe obsoleta = Clitocybe fragrans: Gemäss Literatur handelt es sich um die ein und dieselbe Art.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Weiss ausblassend

Hutmerkmale

Etwas schmierig, gelatinös, stark hygrophan, bei Trockenheit Hut weiss

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Nach Anis

botanisch / ökologisch

Standort

Fichtenwald, Fichtenstreu

mikroskopisch

Sporenmasse

1. Messung: 5.9 - 8.7 x 3.6 - 4.3 µm - Q: 1.50 - 2.18 (Ø LxB: 6.8 x 3.9 ØQ:1.7 AzM: 18)

Sporenform

Schmalelliptisch-spindelrig

Gattung/en:Clitocybe <https://www.mycopedia.ch/pilze/1013.htm>**Siehe auch**Clitocybe odora <https://www.mycopedia.ch/pilze/4339.htm>Cuphophyllum russocoriaceus <https://www.mycopedia.ch/pilze/7677.htm>Clitocybe fragrans <https://www.mycopedia.ch/pilze/10079.htm>



Clitocybe fragrans

Weisser Anistrichterling, Langstieliger Dufttrichterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae



Flammer, T©

6475 05.11.2016



Flammer, T©

11346 12.11.2023



Flammer, T©

6474 05.11.2016



Flammer, T©

7038 04.10.2017



Clitocybe fragrans

Weisser Anistrichterling, Langstieliger Dufttrichterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

