



Clitocybe fragrans

Weisser Anistrichterling, Langstieliger Dufftrichterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate (With.) P. Kumm. 1871

Aktueller Name gem. MycoDB: Clitocybe fragrans (With.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 121 (1871) [MB232936]

Basionym: Agaricus fragrans With., A botanical arrangement of British plants 3: 307 (1792) [MB447526]

Obligate Synonyme:

Lepista fragrans (With.) Harmaja, Karstenia 15: 14 (1976) [MB316545]

Omphalia luffii Masee, Transactions of the British Mycological Society 1 (1): 21 (1898) [MB148274]

Pseudolyophyllum fragrans (With.) Raithehl., Metrodiana: 73 (1978) [MB283659]

Taxonomische Synonyme:

Clitocybe deceptiva H.E. Bigelow, Beihefte zur Nova Hedwigia 72: 108 (1982) [MB110559]

Clitocybe acicola Singer, Zeitschrift für Mykologie 56 (1): 6 (1990) [MB134163]

Omphalia luffii Masee, Transactions of the British Mycological Society 1 (1): 21 (1898) [MB148274]

Clitocybe luffii (Masee) Singer, Annales Mycologici 41: 30 (1960) [MB295146]

Clitocybe luffii (Masee) Singer, Annales Mycologici 41: 30 (1943) [MB532411]

Agaricus suaveolens Schumach., Enumeratio Plantarum, in Partibus Sællandiae Septentrionalis et Orientalis Crescentium 2: 337 (1803) [MB243517]

Clitocybe suaveolens (Schumach.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 121 (1871) [MB176023]

Omphalia suaveolens (Schumacher) Quélet, Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 24 (1886) [MB802661]

Clitocybe fragrans var. depauperata J.E. Lange, Dansk botanisk Arkiv 6 (5): 56 (1930) [MB265280]

Clitocybe depauperata (J.E. Lange) P.D. Orton, Transactions of the British Mycological Society 43 (2): 174 (1960) [MB328425]

Relativ kleine Trichterlingsart, die gerne zwischen Moosen wächst und angenehm anisartig riecht. Bei den Trichterlingen gibt es eine ganze Reihe, die einen anisartigen Geruch aufweisen.

Man findet diesen Trichterling an verschiedenen Standorten, zwischen Moosen, im Laub- und Nadelwald.

Clitocybe obsoleta = Clitocybe fragrans: Gemäss Literatur handelt es sich um die ein und dieselbe Art.

makroskopisch

Hutfarbe

Beige, blass, bräunlich

Hutmerkmale

Feucht etwas fettig anfühlend

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Anisartig

botanisch / ökologisch

Standort

Moos, Magerwiesen, Laubwald, Nadelwald

mikroskopisch

Sporenlänge

6,5 - 8,5 µm

Sporenform

Elliptisch, mandelförmig

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Glatt, im Mikroskop je nach Ansicht Oberfläche etwas rau wirkend

Sporenmerkmale

Hyalin

Varia

Synonyme, Namen dt., Verweis

Clitocybe obsoleta

Gattung/en:

Clitocybe

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1013.htm>



Clitocybe fragrans

Weisser Anistrichterling, Langstieliger Dufttrichterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Siehe auch

Clitocybe odora

<https://www.mycopedia.ch/pilze/4339.htm>


Clitocybe fragrans

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7492.htm>



Flammer, T©


10367 12.11.2019



HDS

Flammer, T©


10369 12.11.2019



HDS

Flammer, T©

10370 12.11.2019



Sporen

Flammer, T©

10368 12.11.2019