



Clitocybe subspadicea

Nabel-Trichterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate (J.E. Lange) Bon & Chevassut 1973

Aktueller Name gem. MycoDB: Clitocybe subspadicea (J.E. Lange) Bon & Chevassut, Documents Mycologiques 3 (9): 36 (1973) [MB311377]

Basionym: Clitocybe umbilicata var. subspadicea J.E. Lange (?) [MB444516]

Obligates Synonym: Gerronema subspadiceum (J.E. Lange) Bon, Documents Mycologiques 26 (102): 19 (1996) [MB434625]

Clitocybe vibecina sehr ähnlich, hat jedoch deutlich grössere Sporen.

Siehe auch:

- Clitocybe foetens,
- Clitocybe metachroa,
- Clitocybe phaeophthalma (mit blasigen Zellen in HDS)

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Weich

Hutmerkmale

Trichterförmig, hygrophan, blass, grau dann verblässend

Lamellenfarbe

Graue Lamellen

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Weiss

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Alkalisch, leicht nitrös, ranzig oder Geruch schwach.

mikroskopisch

Sporenform

Elliptisch

Hutdeckschicht

Mit parallelliegenden verwobenen und braun pigmentierten Hyphen

Schnallen

Vorhanden

Gattung/en:

Clitocybe <https://www.mycopedia.ch/pilze/1013.htm>

Siehe auch

Singerocybe phaeophthalma <https://www.mycopedia.ch/pilze/7438.htm>

Clitocybe vibecina <https://www.mycopedia.ch/pilze/5743.htm>



Clitocybe subspadicea


Nabel-Trichterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae



Flammer, T©

1070 28.09.2009



Flammer, T©

2279 09.10.2011

HDS



Flammer, T©

2278 07.01.2022