



Coniophora arida

Dünnhäutiger Braunsporrindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Coniophoraceae

Legitimate

(Fr.) P. Karst. 1868

Aktueller Name gem. MycoDB: Coniophora arida (Fr.) P. Karst., Not. Sällsk. Fauna Fl. Fenn. Förh. 9: 370 (1868) [MB140661]

Basionym: Thelephora arida Fr., Elenchus Fungorum 1: 197 (1828) [MB178606]

Obligates Synonym: Corticium aridum (Fr.) Sacc., Michelia 1 (1): 5 (1877) [MB439745]

Taxonomische Synonyme:

Thelephora betulae Schumach., Enumeratio Plantarum, in Partibus Sællandiae Septentrionalis et Orientalis Crescentium 2: 396 (1803) [MB440676]

Coniophora berkeleyi Massee, Botanical Journal of the Linnean Society 25: 135 (1889) [MB234774]

Coniophora betulae P. Karst., Hedwigia 35: 174 (1896) [MB234529]

Hypochnus flavobrunneus Dearn. & Bisby, The fungi of Manitoba: 90 (1929) [MB265058]

Corticium subdealbatum Berk. & Broome, Annals and Magazine of Natural History 3: 211 (1879) [MB461672]

Coniophora subdealbata (Berk. & Broome) Massee, Botanical Journal of the Linnean Society 25: 135 (1889) [MB461673]

Peniophora subdealbata (Berk. & Broome) Sacc., Sylloge Fungorum 6: 647 (1888) [MB184243]

Corticium suffocatum Peck, Annual Report on the New York State Museum of Natural History 30: 48 (1878) [MB178395]

Coniophora arida var. suffocata (Peck) Ginns, Opera Botanica 61: 24 (1982) [MB117535]

Coniophora suffocata (Peck) Massee, Botanical Journal of the Linnean Society 25: 138 (1889) [MB123423]

Terana suffocata (Peck) Kuntze, Revisio generum plantarum 2: 873 (1891) [MB440648]

Coniophora arida subsp. macra P. Karst., Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk 37: 244 (1882) [MB468841]

Coniophora macra (P. Karst.) P. Karst., Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica 9: 65 (1882) [MB202868]

Coniophora arida f. hyphis-incrustatis S. Lundell & Åberg, Fungi Exsiccati Suecici Fasc. 5-6: no. 257 (1936) [MB468838]

Coniophora subdealbatum (Berk. & Broome) Massee (1889) [MB258629]

Neben dem Echten Hausschwamm ist der Braunsporrindenpilz einer der am häufigsten vorkommenden Schadpilzen in Gebäuden.

makroskopisch

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Hellbraun

Braun

mikroskopisch

Sporenlänge

10 - 13 µm

Sporenform

Breitelliptisch

Sporenwand

Dickwandig

Hyphen / Hyphensystem

Septen ohne Schnallen, Hyphen nicht inkrustiert

Zystidenform

Spindelig, verdreht, walzenförmig

chemisch

Melzers-Reagenz

Dextrinoid

Gattung/en:

Coniophora

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7601.htm>



Coniophora arida

Dünnhäutiger Braunsporrindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Coniophoraceae



Flammer, T©

10254 29.10.2019




Flammer, T©

10253 29.10.2019



Flammer, T©

10255 29.10.2019



Flammer, T©

10252 29.10.2019


Zystiden



Coniophora arida


Dünnhäutiger Braunsporrindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Coniophoraceae



Flammer, T©

10251 29.10.2019



Flammer, T©

10256 29.10.2019