



## Conocybe semiglobata cf

## Halbkugeliges Samthäubchen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae

Legitimate Kühner ex Singer 1959

Aktueller Name gem. MycoDB: Conocybe semiglobata Kühner ex Singer, Mycologia 51 (3): 395 (1959) [MB295605]

Taxonomische Synonyme:

Conocybe tenera f. semiglobata Kühner, Encyclopédie Mycologique 7: 79 (1935) [MB255055]

Galera tenera f. semiglobata (Kühner) anon. ined. (1980) [MB477086]

Rotstieliges Samthäubchen / Conocybe tenera

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Hygrophan

**Stielbasis / Basis**

Etwas knollig, mit Knöllchen

**Stielmerkmale**

Weiss bepudert

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Angenehm pilzartig

mikroskopisch

**Sporenmasse**

10-14 x 5,5-7 µm

**Sporenmerkmale**

Mit deutlichem Keimporus

**Sporenwand**

Dickwandig

**Basidienmerkmale**

Mit 4 Sterigmen

**Hutdeckschicht**

Mit grossen blasigen Zellen

**Cheilozystiden**

Kopfig

chemisch

**Kalilaugenreaktion / KOH**

Sporen in KOH rostbraun, in Wasser orange

Varia

**Synonyme, Namen dt., Verweis**

SYN. CONOCYBE TENERA FORMA SEMIGLOBATA

**Gattung/en:**

Conocybe

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1016.htm>



Conocybe semiglobata cf


Halbkugeliges Samthäubchen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae




Flammer, T©

2614 15.04.2012




Flammer, T©

2616 15.04.2012



Flammer, T©

2617 15.04.2012



Flammer, T©

2618 15.04.2012



**Conocybe semiglobata cf**

**Halbkugeliges Samthäubchen**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae

