



Coprinopsis cinereofloccosa

Wegrandtintling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae

Legitimate (P.D. Orton) Redhead, 2001
 Vilgalys & Moncalvo

Aktueller Name gem. MycoDB: Coprinopsis cinereofloccosa (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, Taxon 50 (1): 227 (2001) [MB474380]

Basionym: Coprinus cinereofloccosus P.D. Orton, Transactions of the British Mycological Society 43 (2): 198 (1960) [MB328857]

Mikroskopisch lässt sich dieser Tintling dank den auffälligen Sporen rasch eingrenzen. Allerdings beginnt danach die Arbeit, da es eine ganze Art kleiner Tintlinge mit ähnlichen Sporen gibt. Wichtig ist die Sporengrösse, Sporenfarbe, die Ausprägung des Perispor, ob ein Sklerotium vorhanden, der Standort und andere mikroskopische Merkmale.

mikroskopisch

Sporenlänge

9,5 - 13,5 µm

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Ausgeprägt kalyptrate (flügelige) Sporen

Cheilozystiden

Blasig

Gattung/en:

Coprinopsis <https://www.mycopedia.ch/pilze/8562.htm>

Siehe auch


Coprinopsis laanii <https://www.mycopedia.ch/pilze/8654.htm>



Coprinopsis cinereofloccosa


Wegrandtintling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae



Flammer, T©


2360 16.10.2011



Sporen

Flammer, T©

7810 28.04.2018



Sporen

Flammer, T©

2402 23.10.2011



Sporen

Flammer, T©

6012 28.04.2018



Coprinopsis cinereofloccosa

Wegrandtintling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae

