



## Coprinopsis laanii

## Perispor-Holztintling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae

Legitimate (Kits van Wav.) Redhead, 2001  
 Vilgalys & Moncalvo

Aktueller Name gem. MycoDB: Coprinopsis laanii (Kits van Wav.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, Taxon 50 (1): 229 (2001) [MB474612]

Basionym: Coprinus laanii Kits van Wav., Persoonia 5 (2): 146 (1968) [MB328866]

Dieser zierliche Tintling wächst eher auf Grasland als im Wald. Ein Tintling mit sehr ähnlichen Sporen ist Coprinopsis cinereofloccosa.

botanisch / ökologisch

**Standort**

Wächst auf Holz

mikroskopisch

**Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur**

Mit deutlichem Perispor, kalyptratsporig

**Hutdeckschicht**

Runde blasige Zellen mit kleinen Warzen

**Gattung/en:**

Coprinopsis <https://www.mycopedia.ch/pilze/8562.htm>

**Siehe auch**


Coprinopsis cinereofloccosa <https://www.mycopedia.ch/pilze/5691.htm>



Coprinopsis laanii


Perispor-Holztintling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae



Flammer, T©


6392 01.11.2016



Velum

Flammer, T©


6396 01.11.2016



Sporen

Flammer, T©

6395 01.11.2016



Sporen

Flammer, T©

6433 03.11.2016