



Coprinopsis lagopus

Hasenpfote

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae

Legitimate (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001

Aktueller Name gem. MycoDB: Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, Taxon 50 (1): 229 (2001) [MB319071]

Basionym: Agaricus lagopus Fr., Systema Mycologicum 1: 312 (1821) [MB238699]

Obligates Synonym: Coprinus lagopus (Fr.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 250 (1838) [MB194418]

Dieser zierliche Tintlinge findet man häufig in kleinen Gruppen auf nackter Erde an Wegrändern. Er wurzelt nicht und hat ein ausgeprägtes Velum, das sich unterm Mikroskop als eine Kette zylindrisch aneinandergereihter Zellen entpuppt. Die Sporen sind braun-schwarz.

mikroskopisch

Sporenmasse

11-13 x 7,5-8 µm

Sporenmerkmale

Keimporus zentral

Hutdeckschicht

Velum auf Hut aus parallel liegenden, kurzgliederigen Hyphen, teilweise etwas bräunlich pigmentiert

Cheilozytiden

Blasig, nicht sehr zahlreich

Gattung/en:

Coprinopsis <https://www.mycopedia.ch/pilze/8562.htm>

Siehe auch

Coprinus <https://www.mycopedia.ch/pilze/1017.htm>



Coprinopsis lagopus

Hasenpfote

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae




Flammer, T©

1203 22.09.2012




Flammer, T©

3947 25.09.2015



Flammer, T©

2959 25.09.2015



Velum

Flammer, T©

2956 22.09.2012



Coprinopsis lagopus

Hasenpfote

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae

