

**Coprinopsis stercorea****Struppiger Misttintling, Starkbeflockter Mist-Tintling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae

Legitimate (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001

Aktueller Name gem. MycoDB: *Coprinopsis stercorea* (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, Taxon 50 (1): 231 (2001) [MB474201]Basionym: *Coprinus stercoreus* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici*: 251 (1838) [MB438193]

Taxonomische Synonyme:

Coprinus stercorarius f. *diverticulatus* Kits van Wav., *Persoonia* 5 (2): 167 (1968) [MB349229]*Coprinus stercorarius* var. *diverticulatus* (Kits van Wav.) Bogart, *The Genus Coprinus in Washington and Adjacent Western States*: 149 (1975) [MB127215]*Agaricus stercorarius* Scop., *Flora carniolica* 2: 428, no 1484 (1772) [MB490427]*Coprinus stercorarius* Fr., *Hymenomyces europaei*: 330 (1874) [MB160967]

Winziges Pilzchen mit Hutdurchmesser von weniger als 2 - 3 mm. Pflückt man das Pilzchen frisch vorsichtig und schaut es unter der Stereolupe an, wird man sofort das Velum, das aus kugelartigen Zellen besteht sehen. Zusammen mit den ziemlich kleinen Sporen mit Perispor und dem Vorkommen auf Dung ist die Art gut ansprechbar.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Ca. 2 mm

Hutmerkmale

Stark gerieft, mit dichten Velumflocken, mit kleiner Delle

Stielmerkmale

Faserig, flockig

Lamellenmerkmale

Gewellt, Schneiden rosa-lila-schwarz

botanisch / ökologisch

Standort

Auf Dung, dunghaltiger Erde

mikroskopisch

Sporenlänge

6-7 µm

Sporenform

Breitoval, mit Keimporus und Apiculus

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Teilweise mit Perispor

Basidien

4sporig

Hutdeckschicht

Aus runden warzigen Zellen

Cheilozystiden

Utriform, teilweise mit kurzer Papille, auch mit langem schmalem Hals


Gattung/en:*Coprinopsis* <https://www.mycopedia.ch/pilze/8562.htm>**Siehe auch***Coprinellus heptemerus* <https://www.mycopedia.ch/pilze/8528.htm>*Coprinopsis macrocephala* <https://www.mycopedia.ch/pilze/8561.htm>



Coprinopsis stercorea

Struppiger Misttintling, Starkbeflockter Mist-Tintling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae




Flammer, T©

15172 11.05.2023



Flammer, T©

6661 26.03.2017



Flammer, T©

15175 11.05.2023



Flammer, T©


6662 28.03.2017



Coprinopsis stercorea

Struppiger Misttintling, Starkbeflockter Mist-Tintling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae



Flammer, T©


6658 24.03.2017



Flammer, T©

6657 24.03.2017


Hutdeckschicht aus runden warzigen Zellen
Velum



Flammer, T©

6659 11.05.2023

Sporen mit Perispor



Flammer, T©

15173 11.05.2023