



## Cortinarius latiphyllus cf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

Auffällig grosse dünnfleischige Fruchtkörper mit bis zu 13 cm aufgeschirmten Hüten. Sporen im Schnitt 8 x 5,4 µm mit einem Q von 1,5.

Der Geruch wird nicht beschrieben und der Q-Wert der Sporen liegt nur bei 1,5

Im Atlas des Cortinaires wird ein C. latiphyllus beschrieben, der aber kleinere FK hat.

makroskopisch

### **Fleischfarbe / Trama / Farbe Schnitt Fruchtkörper**

Ocker-bräunlich

### **Lamellenmerkmale**

Breit, an der Basis stark anastomisierend

olfaktorisch / organoleptisch

### **Geruch / Geruchsprofil**

Rettichartig mit schwach würziger Komponente (Heterobasidion?)

### **Geschmack**

Mild, an Camembertrinde erinnernd

mikroskopisch

### **Sporenmasse**

1. Messung: 6.7 - 8.8 x 4.8 - 5.8 µm - Q: 1.34 - 1.58 (Ø LxB: 8.0 x 5.4 ØQ:1.5 AzM: 13) Präparat

2. Messung: 8.0 - 9.1 x 4.8 - 5.8 µm - Q: 1.44 - 1.79 (Ø LxB: 8.6 x 5.3 ØQ:1.6 AzM: 21) Abwurf

### **Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur**

Stachelig

Stark warzig-stachelig, dickwandig

chemisch

### **Kalilaugenreaktion / KOH**

Auf Hut negativ

Varia

### **Bemerkungen / Hinweise / Abstract**

Im Sporenabwurfpräparat sieht man die Membran/Warzigkeit nicht mehr. Sie scheint mit der Reife verloren zu gehen.

### **Bestimmt nach**

Atlas des Cortinaires I - XXIII - Diverse Autoren - S.A.R.L. Ed. Féd. Mycol. Dauphine-Savoie à Marlioz (France) - Band 20

### **Synonyme, Namen dt., Verweis**

Hydrocybe striata

### **Gattung/en:**

Cortinarius

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8689.htm>



*Cortinarius latiphyllus* cf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius



Flammer, T©

15857 26.09.2023



Flammer, T©

15858 26.09.2023



Flammer, T©

15859 26.09.2023