



Cortinarius muscigenus

Blaustiel Schleimfuss

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

Legitimate

Peck 1888

Aktueller Name gem. MycoDB: Cortinarius muscigenus Peck, Annual Report on the New York State Museum of Natural History 41: 71 (1888)
[MB178369]

Es gibt noch ein weiterer Schleimfuss, der nach Honig riecht

makroskopisch

Stielfarbe / Rinde

Weisse bereift bzw. mit weissem Velum und mit Lilatönen

Stielmerkmale

Schleimig

mikroskopisch

Sporenmasse

12.9 - 18.2 x 7.2 - 8.9 μm - Q: 1.56 - 2.09 (\emptyset LxB: 15.1 x 8.1 \emptyset Q:1.9 AzM: 16)

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Mittelwarzig

Gattung/en:

Cortinarius

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8689.htm>



Cortinarius muscigenus

Blaustiel Schleimfuss

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius



Stadler, G©

12786 26.09.2021




Flammer, T©

14530 14.10.2022



Flammer, T©

14531 14.10.2022



Flammer, T©

14532 14.10.2022