



**Cortinarius sanguineus**

**Blutroter Hautkopf**

Cortinarius sanguineus	Cortinarius sanguineus	(Wulfen) Gray	1821
	Agaricus sanguineus	Wulfen	1781
	Cortinarius sanguineus	(Wulfen) Gray	1821
	Dermocybe sanguinea	(Wulfen) Wünsche	1877

Diesen blutroten Hautkopf findet man meist auf abgestorbenen, morschen Fichtenstrünken. Seine Farbpigmente sind blutrot und Wolle kann damit gefärbt werden.

makroskopisch

**Fleischfarbe / Trama / Farbe Schnitt Fruchtkörper**

Rötlich bis rot

**Lamellenfarbe**

Lamellenfarbe blutrot

mikroskopisch

**Sporenlänge**

6,5-8 µm

**Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur**

Mittelwarzig

**Marginalzellen**

Teilweise septiert, keulig bauchig

**Gattung/en:**

Cortinarius Cortinarius <https://www.mycopedia.ch/pilze/8689.htm>

**Siehe auch**

Cortinarius cinnamomeus <https://www.mycopedia.ch/pilze/8509.htm>

Cortinarius semisanguineus <https://www.mycopedia.ch/pilze/7216.htm>



Cortinarius sanguineus

Blutroter Hautkopf



Flammer, T©

1255 28.09.2009



Flammer, T©

2790 03.09.2012



Flammer, T©

5115 06.09.2014



Flammer, T©

5116 06.09.2014



**Cortinarius sanguineus**

**Blutroter Hautkopf**



Flammer, T©

7043 04.10.2017



Flammer, T©

1658 07.10.2017