



Crepidotus cesatii var. cesatii

Kugelsporiges Stummelfüsschen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Crepidotaceae, Crepidotus

Legitimate

?

Aktueller Name gem. MycoDB: Crepidotus cesatii var. cesatii (?) [MB419710]

Crepidotus cesatii ist ein häufiger Pilz. Bei den Stummelfüsschen ist ein Blick durchs Mikroskop jedoch meist unerlässlich. Es wird zwischen einer Laubholz und einer Nadelholz-Unterart unterschieden:

- var. cesatii auf Ästen von Laubholz:
- var subsphaerosporus: auf Nadelholz

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Herzförmig, nierenförmig bis ca. 20 mm gross

Hutoberfläche

Feinfilzig

Lamellenfarbe

Blass-altrosa

botanisch / ökologisch

Standort

Laubholz

mikroskopisch

Sporenfarbe in Wasser (Mik)

Gelblich

Sporenform

Rund

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Feinstachelig

Hutdeckschicht

Aus verwobenen Hyphen

Cheilozystiden

Polymorph, knorrig, verzweigt

Schnallen

Vorhanden

chemisch

Melzers-Reagenz

Dextrinoid Sporen

Varia

Bemerkungen / Hinweise / Abstract

Empfindliche Poren, kollabieren im Sporenabwurf rasch und sehen wie zerquetscht aus.

Pilzporträt PDF

Crepidotus cesatii 01

https://www.mycopedia.ch/pilze/collagen/crepidotus_cesatii_01.pdf

Gattung/en:

Crepidotus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1019.htm>

Siehe auch

Crepidotus applanatus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8010.htm>



Crepidotus cesatii var. *cesatii*

Kugelsporiges Stummelfüsschen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Crepidotaceae, Crepidotus



Flammer, T©


13322 14.12.2021



Flammer, T©

11862 26.12.2020

Pilzportrait



Flammer, T©

11864 26.12.2020



Flammer, T©

13250 02.12.2021



Crepidotus cesatii var. *cesatii*

Kugelsporiges Stummelfüsschen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Crepidotaceae, Crepidotus

