



Cuphophyllus virgineus var. virgineus

Weisser Saftling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae, Cuphophyllus

Legitimate

?

Aktueller Name gem. MycoDB: Cuphophyllus virgineus var. virgineus (?) [MB542533]

makroskopisch

Hutfarbe

Weiss bis blassbraun

Hutmerkmale

Speckig

Stielmerkmale

Hohl, zur Basis verjüngend

Lamellenmerkmale

Herablaufend

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Hyalin, nicht amyloid, mit Öltröpfen

botanisch / ökologisch

Standort

Basenreiche Standorte

Vorkommen / Häufigkeit / Saison

Spätherbst nach ersten Frösten

mikroskopisch

Sporenmasse

11-12 x 5-6 µm, auffallend grosse Sporen

Mikroskopische Eigenschaften

Mit schlanken keulenförmigen Marginalzellen

Sporenform

Breitoval

Sporenmerkmale

Teilweise etwas spindelig

Varia

Synonyme, Namen dt., Verweis

Hygrocybe virginea

Gattung/en:

Cuphophyllus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/5704.htm>



Cuphophyllus virgineus var. virgineus

Weisser Saftling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae, Cuphophyllus



Flammer, T©

11613 28.02.2023



Flammer, T©

11612 10.11.2020