



Cystolepiota seminuda

Weisser Mehlschirmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae

Legitimate

(Lasch) Bon 1976

Aktueller Name gem. MycoDB: Cystolepiota seminuda (Lasch) Bon, Documents Mycologiques 6 (24): 43 (1976) [MB312558]

Basionym: Agaricus seminudus Lasch, Linnaea 3: 157 (1828) [MB355963]

Obligate Synonyme:

Lepiota seminuda (Lasch) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 136 (1871) [MB204777]

Cystoderma seminudum (Lasch) Fayod, Annales des Sciences Naturelles Botanique ser. 7, 9: 351 (1889) [MB455927]

Lepiota sistrata var. seminuda (Lasch) Quéf., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 231 (1872) [MB500414]

Cystoderma seminudum (Lasch) Singer (1945) [MB548190]

Taxonomische Synonyme:

Lepiota seminuda f. minima J.E. Lange, Flora Agaricina Danica 1: 36 (1935) [MB254652]

Cystolepiota sistrata var. minima (J.E. Lange) anon. ined. (1976) [MB438239]

Lepiota sistrata f. minima (J.E. Lange) Babos, Annales Historico-Natureles Musei Nationalis Hungarici 50: 91 (1958) [MB349730]

Lepiota sistrata var. minima (J.E. Lange) anon. (?) [MB438599]

Lepiota sororia Huijsman, Persoonia 1 (3): 326 (1960) [MB333144]

Cystolepiota sororia (Huijsman) Singer, Beihefte zur Sydowia 7: 67 (1973) [MB312559]

Cystolepiota seminuda var. sororia (Huijsman) Gminder, Die Großpilze Baden-Württembergs 4: 443 (2003) [MB487640]

makroskopisch

Fruchtkörperfarbe / Farbspektrum

Weiss

Hutmerkmale

Hutrand mit Flocken

mikroskopisch

Sporenlänge

Bis 5 µm

Gattung/en:

Cystolepiota

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1022.htm>



Cystolepiota seminuda

Weisser Mehlschirmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae



Flammer, T©

4533 12.07.2014




Flammer, T©

10628 05.10.2023


HDS mit runden Zellen
HDS

Sporen



Flammer, T©

4535 12.07.2014



Flammer, T©

4536 12.07.2014