



## Entoloma hebes cf

## Flaumstieliger Zystiden-Glöckling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae

Legitimate (Romagn.) Trimbach 1981

Aktueller Name gem. MycoDB: Entoloma hebes (Romagn.) Trimbach, Documents Mycologiques 11 (44): 6 (1981) [MB110645]

Basionym: Rhodophyllus hebes Romagn., Revue de Mycologie (Paris) 19 (1): 4 (1954) [MB282875]

Obligate Synonyme:

Entoloma hirtipes var. hebes (Romagn.) Esteve-Rav., Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid 14: 147 (1990) [MB132308]

Nolanea hebes (Romagn.) P.D. Orton, Transactions of the British Mycological Society 43 (2): 179 (1960) [MB335202]

Taxonomische Synonyme:

Rhodophyllus mammosus var. obsoletus Romagn., Revue de Mycologie (Paris) 19 (1): 7 (1954) [MB352466]

Entoloma hirtipes var. obsoletum (Romagn.) Bon, Documents Mycologiques 13 (49): 45 (1983) [MB116984]

makroskopisch

**Hutfarbe**

Dunkelbraun

**Hutmerkmale**

Radialfaserig, im Zentrum mit runzlig-körniger Papille

**Stielbasis / Basis**

Weiss, winziges Knöllchen

**Stielmerkmale**

7-8 cm

**Lamellenfarbe**

Schmutzig rosa

**Lamellenmerkmale**

Schneiden gleichfarbig

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Ranzig-mehlartig

botanisch / ökologisch

**Standort**

Alpwiese

mikroskopisch

**Sporenmasse**

8.5 - 11.0 x 6.0 - 7.2 µm - Q: 1.35 - 1.67 (Ø LxB: 9.6 x 6.6 ØQ:1.5 AzM: 14)

**Sporenmerkmale**

6-7 eckig

**Cheilozystiden**

1fach septiert, Basidien nicht überragend

**Schnallen**

Vorhanden

Varia

**Bestimmt nach**

Ludwig Erhard, Pilzkompendium, IHW-Verlag

**Gattung/en:**

Entoloma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1025.htm>