



Entoloma resutum

Mausgrauer Rötling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae

Legitimate

(Fr.) Quél. 1877

Aktueller Name gem. MycoDB: Entoloma resutum (Fr.) Quél., Bulletin de la Société Botanique de France 23: 326, XLII (1877) [MB196455]

Basionym: Agaricus resutus Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 145 (1838) [MB461683]

Obligates Synonym: Rhodophyllus jubatus var. resutus (Fr.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 58 (1886) [MB492408]

Die durchschnittliche Sporengrösse rangiert am unteren Ende der Bandbreite, die Messung wurde am Exsikkat und nicht am Frischmaterial gemacht. Die Grösse liegt jedoch im Rahmen der in der Literatur beschriebenen Bandbreiten.

makroskopisch

Hutfarbe

Grau

Hutmerkmale

Radialfaserig, feinschuppig, etwas körnig

Lamellenfarbe

Grau

botanisch / ökologisch

Standort

Sphagnum

mikroskopisch

Sporenmasse

8.0 - 12.0 x 6.2 - 8.1 μm - Q: 1.14 - 1.64 (\emptyset LxB: 9.8 x 7.0 AzM: 19)

Sporenform

Mit 5 - 7 stark ausgeprägten Ecken

Hutdeckschicht

Aus pigmentierten diffusen und verwobenen Hyphen

Cheilozystiden

Keine

Schnallen

Spärlich bis fehlend?

Gattung/en:

Entoloma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1025.htm>



Entoloma resutum


Mausgrauer Rötling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae



Flammer, T©

9995 16.09.2019



Flammer, T©

9996 16.09.2019