



## Entoloma sepium

## Schlehen-Rötling, Blassbrauner Schlehen-Rötling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae

Legitimate (Noulet & Dass.) Richon & Roze 1880

Aktueller Name gem. MycoDB: Entoloma sepium (Noulet & Dass.) Richon & Roze, Fl. champ. com. ven.: 92 (1880) [MB493302]

Basionym: Agaricus sepium Noulet & Dass., Traité des Champignons comestibles suspects et vénéneux qui croissent dans le bassin sous-pyrénéen: 115 (1838) [MB660254]

Obligate Synonyme:

Entoloma saepium (Noulet & Dass.) Richon & Roze (1880) [MB438320]

Agaricus saepium Noulet & Dass. (1838) [MB455915]

Rhodophyllus saepium (Noulet & Dass.) Romagn. (1947) [MB305260]

Agaricus saepius Noulet & Dass. (1838) [MB490855]

Entoloma clypeatum var. sepium (Noulet & Dass.) G. Poirault & Roze, Bulletin de la Société Botanique de France 27: 257-261 (1880) [MB500391]

Rhodophyllus sepius (Noulet & Dass.) Romagn. (1947) [MB535413]

Agaricus sepius Noulet & Dass. (1838) [MB534535]

Rhodophyllus sepium (Noulet & Dass.) Romagn., Bulletin Trimestriel de la Société Mycologique de France 63: 195 (1947) [MB535414]

Taxonomische Synonyme:

Agaricus prunarii Schulzer, Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 29: 496 (1879) [MB490648]

Agaricus clypeatus var. prunarii (Schulzer) Schulzer, Verh. Mitt. Siebenbürg. Vereins Naturwiss.: 30 (1884) [MB499976]

Rhodophyllus clypeatus var. murinus Quél., Comptes Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences 26 (2): 448 (1898) [MB500450]

Dieser Rötling kommt unter verschiedenen Pflanzen wie Schlehen, Weissdorn, Pflaume vor. In überdüngten Wiesen hat man keine Chance, es müssen magere und ungedüngte Wiesen sein.

Der Pilz erscheint bereits früh im Mai. Es gibt noch eine ganze Reihe Rötlinge die relativ früh im Jahr erscheinen.

botanisch / ökologisch

**Standort**

Bei Weissdorn, Schlehen, Pflaumenbäumen

**Vorkommen / Häufigkeit / Saison**

Frühjahr-Sommer

chemisch

**Chemische Reaktionen**

Anilin: Verfärbung rot

Guajak: Verfärbung blau

Varia

**Bemerkungen / Hinweise / Abstract**

Dieser Fund aus dem Pfälzerwald habe ich unter einem Pflaumenbaum gemacht. Die Bestimmung ist rein makroskopisch und erfolgte aufgrund des Standortes.

**Gattung/en:**

Entoloma <https://www.mycopedia.ch/pilze/1025.htm>

**Siehe auch**

Entoloma clypeatum <https://www.mycopedia.ch/pilze/7173.htm>  
<https://www.mycopedia.ch/pilze/8579.htm>



Entoloma sepium

Schlehen-Rötling, Blassbrauner Schlehen-Rötling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae



Flammer, T©

7505 02.04.2018



Flammer, T©

7506 02.04.2018



Flammer, T©

7507 02.04.2018



Flammer, T©

7508 02.04.2018