



## Galerina badipes

## Braunfüßiger Häubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

Legitimate

(Pers.) Kühner 1935

Aktueller Name gem. MycoDB: *Galerina badipes* (Pers.) Kühner, Encyclopédie Mycologique 7: 222 (1935) [MB250935]

Basionym: *Agaricus badipes* Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 196 (1838) [MB457250]

Obligate Synonyme:

*Galera badipes* (Pers.) Ricken, Die Blätterpilze 1: 228 (1915) [MB438359]

*Naucoria badipes* (Fr.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 77 (1871) [MB211368]

*Galerula badipes* (Pers.) Kühner, Bull. Soc. mycol. Fr.: 78 (1934) [MB250936]

Taxonomische Synonyme:

*Galerina acre* Gulden (1980) [MB112941]

*Galerina acris* Gulden, Norwegian Journal of Agricultural Sciences 27 (4): 236 (1980) [MB536208]

Aufgrund der sehr langen CHZ und den fast glatten Sporen passt dieser Fund am ehesten zur Beschreibung in EHLU der *Galerina norvegica*. S

makroskopisch

**Substrat**

Final morsches Nadelholz

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Unbedeutend

mikroskopisch

**Sporenmasse**

8.1 - 10.4 x 5.0 - 6.0 µm - Q: 1.44 - 1.96 (Ø LxB: 9.3 x 5.4 ØQ:1.7 AzM: 16)

**Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur**

Praktisch glatt

**Cheilozystiden**

Flaschenförmig mit langem spindeligen Hals, der doppelt so lang ist wie der Basalteil

chemisch

**Melzers-Reagenz**

Stark dextrinoide Sporen

Varia

**Bestimmt nach**

Ludwig Erhard, Pilzkompendium, IHW-Verlag

**Gattung/en:**

Galerina

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1030.htm>