



Ganoderma adpersum

Wulstiger Lackporling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Ganodermataceae

Legitimate (Schulzer) Donk 1969

Aktueller Name gem. MycoDB: Ganoderma adpersum (Schulzer) Donk, Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Section C 72: 273 (1969) [MB314302]

Basionym: Polyporus adpersus Schulzer, Flora: 11 (1878) [MB169202]

Taxonomische Synonyme:

Ganoderma europaeum Steyaert, Bulletin du Jardin Botanique de l'État à Bruxelles 31: 70 (1961) [MB331178]

Polyporus linhartii Kalchbr., Fungi Hong. no 252: no. 252 (1884) [MB171709]

Ganoderma linhartii (Kalchbr.) Z. Igmándy, Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae 3: 237 (1968) [MB331188]

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Jung wulstig, weiss, mehrjährig, korkig zäh

Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren

Bräunend

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Pilzig-säuerlich

chemisch

Kalilaugenreaktion / KOH

Schwarz

Gattung/en:

Ganoderma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7139.htm>



Flammer, T©

13648 06.06.2022



Flammer, T©

13649 06.06.2022