



Ganoderma lucidum

Glänzender Lackporling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Ganodermataceae

Legitimate (Curtis) P. Karst. 1881

Aktueller Name gem. MycoDB: Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., Revue Mycologique Toulouse 3 (9): 17 (1881) [MB148413]

Basionym: Boletus lucidus Curtis, Fl. Iondinensis 4: 72, t. 224 (1781) [MB269837]

Obligate Synonyme:

Polyporus lucidus (Curtis) Fr., Systema Mycologicum 1: 353 (1821) [MB449530]

Fomes lucidus (Curtis) Cooke, Grevillea 13 (68): 118 (1885) [MB159723]

Placodes lucidus (Curtis) Quéél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 170 (1886) [MB472359]

Grifola lucida (Curtis) Gray, A natural arrangement of British plants 1: 644 (1821) [MB362180]

Phaeoporus lucidus (Curtis) J. Schröt., Kryptogamen-Flora von Schlesien 3-1(4): 491 (1888) [MB470439]

Taxonomische Synonyme:

Ganoderma cantharelloideum M.H. Liu, Acta Mycologica Sinica 8 (4): 279 (1989) [MB126185]

Boletus rugosus Jacq., Flora Austriaca 2: 44, f. 169 (1774) [MB473292]

Boletus obliquatus Bull., Herbar de la France 1: t. 7 (1781) [MB194313]

Ganoderma ostreatum Lázaro Ibiza, Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.: 110 (1916) [MB141406]

Agaricus pseudoboletus Jacq., Miscellanea austriaca ad botanicum, chemiam et historiam naturalem spectantia 1: 26, t. 41 (1773) [MB468090]

Ganoderma pseudoboletus (Jacq.) Murrill, Bulletin of the Torrey Botanical Club 29: 602 (1902) [MB469335]

Boletus vernicosus Bergeret, Phytomonatotechnie universelle 1: 99 (1783) [MB468342]

Boletus castaneus Weber, Suppl. Fl. hols.: 13 (1787) [MB473713]

Boletus supinus var. castaneus (Weber) J.F. Gmel., Systema Naturae 2 (2): 1433 (1792) [MB498207]

Boletus laccatus Timm, Flora megapolitanae Prodomus exhibeus plantas ductatus Megapolitano: 269 (1788) [MB468291]

Polyporus laccatus (Timm) Pers., Mycologia Europaea 2: 54 (1825) [MB156470]

Boletus crustatus J.J. Planer, Index Plantarum quas in Agro Erfurtensi sponte provenientes: 280 (1788) [MB468261]

Boletus verniceus Brot., Flora Lusitanica 2: 468 (1804) [MB468341]

Boletus flabelliformis Leyss., Flora halensis: 219 (1761) [MB255032]

Boletus ramulosum var. flabelliformis (Leyss.) J.F. Gmel., Systema Naturae 2 (2): 1435 (1792) [MB498190]

Agaricus lignosus Lam., Encyclopédie Méthodique, Botanique 1-1: 51 (1783) [MB468048]

Ganoderma nitens Lázaro Ibiza, Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.: 104 (1916) [MB451357]

Agarico-igniarium trulla Paulet, Traité des champignons 2: 95, pl. 10:1-2 (1793) [MB467960]

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (?) [MB570035]

Meist bei Weisstanne,

botanisch / ökologisch

Standort

Bei Weisstanne

mikroskopisch

Sporenmasse

11-13,5 x 7,5-8,5 µm

Varia

Bemerkungen / Hinweise / Abstract

Siehe auch Podofomes trogii, Ischnoderma trogii

Gattung/en:

Ganoderma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7139.htm>



Ganoderma lucidum

Glänzender Lackporling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Ganodermataceae



Flammer, T©

6199 21.08.2016



alte Exemplare im Spätherbst

Flammer, T©

3628 05.05.2013



alte Exemplare im Spätherbst

Flammer, T©

3629 17.10.2020



alte Exemplare im Spätherbst

Flammer, T©

3627 05.05.2013



Ganoderma lucidum

Glänzender Lackporling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Ganodermataceae

