



Hebeloma laterinum

Bräunender Fälbling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

Legitimate (Batsch) Vesterh. 2005

Aktueller Name gem. MycoDB: Hebeloma laterinum (Batsch) Vesterh., Fungi of Northern Europe 3: The genus Hebeloma: 106 (2005) [MB366302]

Basionym: Agaricus laterinus Batsch, Elenchus fungorum. Continuatio secunda: 29, tab. 33, fig. 195 (1789) [MB326713]

Ein "milder" Fälbling mit angenehmen Geruch

makroskopisch

Stielbasis / Basis

Knollig, verdickt

Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren

Bräunend/schwärzend im Schnitt und bei Verletzungen

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Angenehm

Geschmack

Angenehm pilzartig, danach (etwas adstringierend?)

mikroskopisch

Sporenmasse

8,5-11,5 x 5-6,5

Sporenform

Zitronen-mandelförmig fein punktiert, gelblich im Mikroskop

Gattung/en:

Hebeloma <https://www.mycopedia.ch/pilze/3762.htm>

Siehe auch

Hebeloma sordescens <https://www.mycopedia.ch/pilze/7015.htm>

Hebeloma sacchariolens <https://www.mycopedia.ch/pilze/4390.htm>



Hebeloma laterinum

Bräunender Fälbling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae



Flammer, T©

10226 25.10.2019




Flammer, T©

10225 25.10.2019



Flammer, T©

10227 25.10.2019



Flammer, T©

10238 28.10.2019