



Hebeloma velutipes

Flockenstieliger Fälbling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

Legitimate

Bruchet 1970

Aktueller Name gem. MycoDB: Hebeloma velutipes Bruchet, Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon 39: 127 (1970) [MB314982]

Taxonomische Synonyme:

Hebeloma angustifolium Romagn., Sydowia 36: 258 (1983) [MB115176]

Hebeloma tenuifolium Romagn., Documents Mycologiques: 53 (1985) [MB105341]

Hebeloma bulbosum Romagn., Sydowia 36: 263 (1983) [MB115184]

Hebeloma favrei Romagn. & Quadr., Documents Mycologiques 14 (56): 31 (1985) [MB105340]

Hebelomatis velutipes (Bruchet) Locq., Flore mycologique 3: 146 (1979) [MB315024]

Dieser Fälbling ist einer der häufigsten Fälblinge, welcher keinen speziellen Mykorrhizapartner benötigt.

makroskopisch

Hutmerkmale

Blass, schmierig, vom Rand her ausblassend, hygrophan

Stielmerkmale

Weiss flockig, an der Stielspitze feine Guttinationströpfchen

Lamellenmerkmale

Gesägt, im Alter braunfleckig

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Dunkelbraun

mikroskopisch

Sporenform

Mandelförmig bis etwas spindelig

Sporenmerkmale

Kalyptrat

Cheilozystiden

Keulig, mit gelblichem Inhalt (KOH)

chemisch

Melzers-Reagenz

Jod Sporen dextrinoid

Gattung/en:

Hebeloma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/3762.htm>



Hebeloma velutipes

Flockenstieliger Fälbling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae



Flammer, T©

7116 05.11.2017



Flammer, T©

7115 05.11.2017

mit feinen Guttinationströpfchen



Flammer, T©

7112 05.11.2017



Flammer, T©


7114 05.11.2017



Hebeloma velutipes


Flockenstieliger Fälbling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae



Flammer, T©

7117 05.11.2017



Flammer, T©

7128 05.11.2017



Flammer, T©

7118 05.11.2017